

Si tiene **DEFICIENCIA DE HIERRO** en
la **INSUFICIENCIA CARDÍACA**

INJECTAFER PUEDE AYUDARLE A LLEGAR MÁS LEJOS


¿Pertenece aproximadamente al 50 % de las
personas con insuficiencia cardíaca que tienen
deficiencia de hierro?

Injectafer® (inyección de carboximaltosa férrica) está disponible solo con receta. Consulte a su proveedor de atención médica si Injectafer es correcto para usted.

¿Qué es Injectafer?

Injectafer es un medicamento de venta con receta de reemplazo de hierro, administrado solo por su proveedor de atención médica o bajo su supervisión. Injectafer se inyecta en la vena para tratar la anemia por deficiencia de hierro en adultos y niños a partir de 1 año de edad. Debe utilizar Injectafer solo si no ha respondido bien al tratamiento con hierro oral o si es intolerante al tratamiento de hierro oral. También se usa para tratar la anemia por deficiencia de hierro en adultos con enfermedad renal crónica que no reciben diálisis. Injectafer se usa para mejorar la habilidad de hacer ejercicio (capacidad de ejercicio) en pacientes adultos con deficiencia de hierro e insuficiencia cardíaca de leve a moderada. Se desconoce si Injectafer es seguro y eficaz en niños con anemia por deficiencia de hierro que tienen menos de 1 año de edad o en niños con deficiencia de hierro e insuficiencia cardíaca de leve a moderada para mejorar la capacidad de ejercicio.

Haga [clic aquí](#) para ver la información de prescripción completa y consulte la información importante de seguridad en las páginas [22-23](#).



injectafer®
ferric carboxymaltose injection

CONOZCA INJECTAFER

Injectafer es el único tratamiento de hierro por vía intravenosa (VI) aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) para ciertos adultos con deficiencia de hierro e insuficiencia cardíaca de leve a moderada*.

En un estudio, Injectafer ayudó a los pacientes a caminar más lejos en una prueba que mide la capacidad para el ejercicio.

*Para pacientes adultos adecuados con insuficiencia cardíaca y clase II/III de la Asociación del Corazón de Nueva York (New York Heart Association, NYHA).



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

¿Quién no debe recibir Injectafer?

No debe recibir Injectafer si es alérgico a la carboximaltosa férrica o a cualquiera de los otros ingredientes en Injectafer. El ingrediente activo en Injectafer es carboximaltosa férrica; los ingredientes inactivos son agua para inyección, hidróxido de sodio o ácido clorhídrico.



¿PODRÍA TENER INSUFICIENCIA CARDÍACA Y DEFICIENCIA DE HIERRO AL MISMO TIEMPO?

LA DEFICIENCIA DE HIERRO SE PRODUCE CUANDO EL CUERPO TIENE UNA DEFICIENCIA (O UN NIVEL BAJO) DE HIERRO, UN NUTRIENTE ESENCIAL.

Si tiene insuficiencia cardíaca, puede tener un riesgo alto de deficiencia de hierro por las siguientes razones:



**EXTRACCIONES
DE SANGRE
FRECUENTES**



**PROBLEMAS DE
ABSORCIÓN DE
HIERRO**



**SANGRADO EN
EL ESTÓMAGO
O LOS INTESTINOS**



**SANGRE
CRÓNICA EN
LA ORINA**



**INFLAMACIÓN
CRÓNICA**



**UNA ETAPA MÁS
AVANZADA DE
INSUFICIENCIA
CARDIACA**

La deficiencia de hierro puede dañar los músculos del corazón y puede afectar negativamente a las funciones del corazón. Si tiene insuficiencia cardíaca, estas consecuencias pueden agravar su afección.

Para concientizar: A los estadounidenses de raza negra se les diagnostica insuficiencia cardíaca con una frecuencia casi 2 veces mayor que a los estadounidenses de raza blanca. Si tiene un riesgo mayor, consulte a su profesional de atención médica si es necesario realizar seguimientos adicionales.

Haga [clic aquí](#) para ver la información de prescripción completa y consulte la información importante de seguridad en las páginas [22-23](#).

NO IGNORE LAS COINCIDENCIAS*

Debido a que algunos de los síntomas de deficiencia de hierro pueden coincidir con los síntomas de insuficiencia cardíaca y ser similares, puede ser difícil diferenciarlas.

CONOZCA LAS SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE LA DEFICIENCIA DE HIERRO Y LA INSUFICIENCIA CARDÍACA

SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA DE HIERRO

- Manos y pies fríos
- Irritabilidad
- Uñas quebradizas
- Deseos extraños de alimentos o de otras cosas

SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA DE HIERRO E INSUFICIENCIA CARDÍACA

- Fatiga y debilidad
- Latidos cardíacos irregulares
- Dificultad para concentrarse
- Falta de aire
- Dolor torácico
- Falta de apetito

SÍNTOMAS DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

- Hinchazón de piernas, tobillos, abdomen y pies
- Aumento de peso
- Náuseas

*Injectafer no está indicado para tratar los síntomas de la deficiencia de hierro, la insuficiencia cardíaca ni la deficiencia de hierro en la insuficiencia cardíaca.

CÓMO AFECTA LA DEFICIENCIA DE HIERRO EN LA INSUFICIENCIA CARDÍACA A LA CAPACIDAD DE EJERCICIO

A medida que la insuficiencia cardíaca avanza, los síntomas pueden empeorar y reducir la actividad física y la capacidad de ejercicio. Esto sucede especialmente si tiene deficiencia de hierro sin diagnosticar y/o sin tratar. Para prepararse para su próxima cita, continúe evaluando su rutina diaria y cuánto ejercicio puede hacer.

CONTROLE SU RUTINA DIARIA

Antes de su próxima cita, lleve un registro para compartir con su profesional de atención médica.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

¿Qué debo informarle a mi proveedor de atención médica antes de recibir Injectafer® (carboximaltosa férrica)?

Antes de recibir Injectafer, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:

- Tuvo una reacción alérgica al hierro administrado en la vena.
- Tiene antecedentes de problemas para que su cuerpo absorba ciertas vitaminas o fosfato.
- Tiene enfermedad intestinal inflamatoria.

Haga [clic aquí](#) para ver la información de prescripción completa y consulte la información importante de seguridad en las páginas [22-23](#).

PREGUNTE SOBRE LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN DE DEFICIENCIA DE HIERRO

Su profesional de atención médica puede solicitar análisis de laboratorio y/o extracciones de sangre para evaluar cambios relacionados con la insuficiencia cardíaca y para buscar otras causas del empeoramiento de los síntomas, incluida la deficiencia de hierro. Estas pruebas incluyen la revisión de los niveles de **ferritina, saturación de transferrina (ST) y hemoglobina**.

¿Cómo puede saber, a partir de los valores de laboratorio, si tiene deficiencia de hierro en la insuficiencia cardíaca?*† Compruebe si sus:

- Niveles de ferritina son inferiores a 100 ng/ml.
- Niveles de ferritina están entre 100 ng/ml y 300 ng/ml, si la ST es <20 %.

**HAGA CLIC AQUÍ PARA VISITAR
INJECTAFER.COM/SCREENING**

HABLE CON SU PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA

Consulte durante su próxima visita si le harán pruebas de ferritina, ST y hemoglobina.

*Los valores normales pueden variar por muchos motivos, incluidas las afecciones que usted puede tener o el lugar donde le realizaron sus análisis de laboratorio. Por esa razón, es importante analizar los resultados de análisis de laboratorio con su profesional de atención médica para averiguar lo que significan.

†Su profesional de atención médica también puede fijarse en sus niveles de hemoglobina.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

¿Qué debo informarle a mi proveedor de atención médica antes de recibir Injectafer® (carboximaltosa férrica)? (cont.)

Antes de recibir Injectafer, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:

- Tiene hiperparatiroidismo.
- Tiene niveles bajos de vitamina D.
- Tiene presión arterial alta.
- Ha recibido Injectafer previamente.

Para adultos adecuados con deficiencia de hierro en la insuficiencia cardíaca,

INJECTAFER ES EL ÚNICO HIERRO VÍA INTRAVENOSA APROBADO POR LA FDA

INJECTAFER ES EL HIERRO VÍA INTRAVENOSA MÁS ESTUDIADO Y AMPLIAMENTE UTILIZADO

¿Injectafer es una opción para usted?

- Injectafer está aprobado para tratar a adultos con:
 - deficiencia de hierro con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca; y
 - clase II/III de la Asociación del Corazón de Nueva York (NYHA) (consulte a su profesional de atención médica si esto lo incluye a usted).
 - Injectafer puede mejorar su habilidad para hacer ciertas actividades físicas (capacidad de ejercicio).

Su profesional de atención médica determinará la dosis correcta de Injectafer para usted.

- Cada dosis de Injectafer se basa en su peso y en los niveles de hemoglobina.
- Recibirá Injectafer según su recomendación recetada.
- Se pueden administrar dosis adicionales durante las últimas 6 semanas si todavía hay deficiencia de hierro.



Haga **clic aquí** para ver la información de prescripción completa y consulte la información importante de seguridad en las páginas **22-23**.



INJECTAFER PUEDE AYUDARLE A LLEGAR MÁS LEJOS

En un estudio de adultos con insuficiencia cardíaca y deficiencia de hierro que recibieron tratamiento con Injectafer, se hizo una prueba de caminata de 6 minutos para evaluar la habilidad de una persona para hacer ejercicio liviano. Esta prueba mide la distancia que se puede caminar en un total de 6 minutos.

INJECTAFER AUMENTÓ LA DISTANCIA QUE LOS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO PUDIERON CAMINAR EN 82 PIES.

Las personas que recibieron tratamiento con Injectafer también observaron una mejora significativa en los valores de ferritina, ST y hemoglobina.



¿CUÁN LEJOS ES ~82 PIES?




TRES CUARTAS PARTES DE UN PASILLO PROMEDIO DE UN SUPERMERCADO



APROXIMADAMENTE EL LARGO DE UNA CANCHA DE TENIS



UN CUARTO DEL ANCHO DE UNA CUADRA DE CIUDAD



Cuando se trata de su salud, ¡no se pierda un paso!

POSIBLES PASOS SECUNDARIOS

¿QUÉ INFORMACIÓN IMPORTANTE NECESITO SABER SOBRE INJECTAFER?

Algunos pacientes experimentan náuseas, presión arterial alta, rubor, dolor o moretones en el lugar de la inyección, enrojecimiento, niveles bajos de fósforo en sangre, mareos y vómitos.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Injectafer. Comuníquese con su profesional de atención médica para recibir consejo médico sobre los efectos secundarios.

BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA SI SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES EFECTOS SECUNDARIOS GRAVES:

Reacciones alérgicas (hipersensibilidad). Han ocurrido reacciones alérgicas graves potencialmente mortales en personas que reciben Injectafer. También se han presentado otras reacciones graves, como picazón, erupción cutánea, ronchas, sibilancias y presión arterial baja durante el tratamiento con Injectafer. Informe a su profesional de atención médica si alguna vez ha tenido alguna reacción alérgica o inusual a algún hierro administrado por vena.

Síntomas de niveles bajos de fosfato en sangre. Informe a su profesional de atención médica si presenta alguno de estos signos o síntomas de niveles bajos de fosfato en sangre durante el tratamiento con Injectafer: sensación de mucho cansancio, debilidad o dolor muscular, dolor de huesos o articulaciones, fracturas óseas.

Presión arterial alta (hipertensión). Ha ocurrido presión arterial alta, a veces con rubor facial, mareos o náuseas, durante el tratamiento con Injectafer. Después de recibir una dosis de Injectafer, su profesional de atención médica lo supervisará para detectar signos y síntomas de presión arterial alta.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

¿Qué debo informarle a mi proveedor de atención médica antes de recibir Injectafer? (cont.)

Antes de recibir Injectafer, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:

- Está embarazada o planea quedar embarazada. Injectafer puede dañar a su bebé en gestación. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si queda embarazada o cree que está embarazada durante el tratamiento con Injectafer.

Haga [clic aquí](#) para ver la información de prescripción completa y consulte la información importante de seguridad en las páginas [22-23](#).




CÓMO OBTENER SU INFUSIÓN DE INJECTAFER

ADÓNDE IR:

- Injectafer suele administrarse en un centro de infusión, y lo administra un profesional de atención médica.
- Los centros de infusión son centros médicos equipados y dotados con personal para administrar infusiones.

HAGA CLIC AQUÍ PARA VISITAR [INJECTAFER.COM/LOCATOR](https://injectafer.com/locator)



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

¿Qué debo informarle a mi proveedor de atención médica antes de recibir Injectafer? (cont.)

Antes de recibir Injectafer, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:

- está amamantando o planea amamantar. Injectafer pasa a la leche materna. No se sabe si Injectafer dañará a su bebé. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento con Injectafer.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

DESPUÉS DE SU INFUSIÓN

UNA VEZ QUE RECIBA SU INFUSIÓN, ES IMPORTANTE QUE:



HAGA UN SEGUIMIENTO DE SU PROGRESO

mediante un registro de cómo se siente.



LLAME A SU PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA

si experimenta efectos secundarios.



HAGA UN SEGUIMIENTO CON SU PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA

para ver qué tan bien funciona su tratamiento. Es posible que necesite una dosis de mantenimiento adicional de Injectafer.


Haga **clic aquí** para ver la información de prescripción completa y consulte la información importante de seguridad en las páginas **22-23**.




HAGA UN SEGUIMIENTO DE SU PROGRESO

¿CÓMO SE SIENTE?

Fecha:	Fecha:
Síntoma(s):	Síntoma(s):
Fecha:	Fecha:
Síntoma(s):	Síntoma(s):



Fecha:	Fecha:
Síntoma(s):	Síntoma(s):



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

¿Cómo recibiré el Injectafer?

Su proveedor de atención médica le administra Injectafer en la vena (por vía intravenosa) en 2 dosis con al menos 7 días de diferencia. Para algunos pacientes con insuficiencia cardíaca, es posible que sea necesario administrar 2 dosis con 6 semanas de diferencia. Si su proveedor de atención médica decide que es adecuado para usted, puede administrarle Injectafer por vía intravenosa en un tratamiento de una sola dosis. El tratamiento con Injectafer puede repetirse si su proveedor de atención médica decide que es necesario.

Haga **clic aquí** para ver la información de prescripción completa y consulte la información importante de seguridad en las páginas **22-23**.



DOS MANERAS DE AYUDARLE A PAGAR LOS TRATAMIENTOS DE INJECTAFER

Si tiene una receta de Injectafer, puede obtener ayuda con sus gastos de bolsillo.

1

SI SU SEGURO COMERCIAL CUBRE INJECTAFER, PERO TIENE QUE HACER UN COPAGO



PROGRAMA DE AHORRO DE INJECTAFER*

El Programa de ahorro de Injectafer puede ayudar a pacientes elegibles con su responsabilidad de gastos de bolsillo para la receta de Injectafer.

LOS PACIENTES RECIBEN CADA DOSIS POR TAN SOLO \$50

Para pacientes elegibles:

- Asistencia de hasta \$500 por dosis.
- La inscripción es válida para 2 cursos de tratamiento por un período de 12 meses.



CÓMO INSCRIBIRSE

Pídale a su profesional de atención médica que lo inscriba antes de recibir el tratamiento con Injectafer. Si su profesional de atención médica no puede inscribirlo, puede inscribirse usted mismo de una de las dos formas siguientes:

- La mejor forma de inscribirse es visitando injectafercopay.com
- O
- Llame a Daiichi Sankyo Access Central (1-866-437-4669)

2

SI NO TIENE SEGURO PARA CUBRIR EL TRATAMIENTO O TIENE UN SEGURO COMERCIAL LIMITADO



PROGRAMA DE ASISTENCIA AL PACIENTE†

El Programa de asistencia al paciente fue creado para ayudar a los pacientes que no tienen seguro de salud, o tienen un seguro comercial limitado y no pueden pagar la terapia.



DAIICHI SANKYO ACCESS CENTRAL

1-866-4-DSI-NOW (1-866-437-4669) está disponible.

*El Programa de ahorro de Injectafer solo está disponible para pacientes de 1 año de edad o más que tienen un seguro comercial. Los gastos de bolsillo del seguro deben ser superiores a \$50 por dosis. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Consulte los Términos y condiciones completos en DSIAccessCentral.com/patient/home.

†Se aplican términos y condiciones.

Haga clic aquí para ver la información de prescripción completa y consulte la información importante de seguridad en las páginas 22-23.



TÉRMINOS QUE PUEDE OÍR CUANDO HABLE SOBRE LA DEFICIENCIA DE HIERRO




FERRITINA

La ferritina es una proteína de la sangre que retiene el hierro hasta que se lo necesita. Se realiza una prueba de ferritina para determinar cuánto hierro está almacenando el cuerpo.



DEFICIENCIA DE HIERRO

La deficiencia de hierro ocurre cuando las reservas de hierro del cuerpo son bajas y no pueden satisfacer las necesidades del cuerpo.




HEMOGLOBINA

La hemoglobina es una proteína rica en hierro que se encuentra en los glóbulos rojos y que transporta oxígeno por todo el cuerpo.



ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO

Significa que el cuerpo tiene una deficiencia, o una disminución, de hierro, lo que provoca una incapacidad de producir glóbulos rojos.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Injectafer?

Injectafer puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:



- **Reacciones alérgicas.** Han ocurrido reacciones alérgicas graves potencialmente mortales, que pueden provocar la muerte, en personas que reciben Injectafer y que pueden incluir los siguientes signos y síntomas: presión arterial baja, sensación de

mareo o aturdimiento, pérdida de la conciencia, problemas para respirar, hinchazón, latidos cardíacos rápidos, piel fría o húmeda, pies o manos que se tornan azul, picazón, erupción cutánea, ronchas y/o sibilancias. Su proveedor de atención médica lo observará mientras recibe Injectafer y durante al menos 30 minutos después. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta algún signo o síntoma de reacciones alérgicas durante el tratamiento con Injectafer o después.



SATURACIÓN DE TRANSFERRINA (ST)

La transferrina es una proteína que transporta hierro en el cuerpo. La prueba de ST se utiliza para medir cuánta transferrina hay disponible para retener hierro.



Haga [clic aquí](#) para ver la información de prescripción completa y consulte la información importante de seguridad en las páginas [22-23](#).





**CUIDAR DE UN SER QUERIDO
CON INSUFICIENCIA
CARDÍACA ES UNA TAREA
IMPORTANTE QUE PUEDE
REQUERIR MUCHA ENERGÍA.**

Para ayudar con las tareas diarias,
consulte la siguiente colección de consejos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Injectafer? (cont.)

Injectafer puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Síntomas de niveles bajos de fosfato en sangre.** Injectafer puede causar niveles bajos de fosfato en sangre que pueden

ser graves y provocar ablandamiento de los huesos o fracturas óseas, especialmente en personas que han recibido varios tratamientos con Injectafer. Su proveedor de atención médica puede controlar sus niveles de fosfato en sangre antes de repetir el tratamiento con Injectafer si usted corre el riesgo de tener niveles bajos de fosfato en sangre.

**EL COMPROMISO PUEDE SER GRANDE,
PERO SUS ESFUERZOS PUEDEN MARCAR
UNA DIFERENCIA AÚN MAYOR.**

**CÓMO
HACERLO:**

Haga [clic aquí](#) para ver la información de prescripción completa y consulte la información importante de seguridad en las páginas [22-23](#).




SEGUIMIENTO DE LOS VALORES DE LABORATORIO

FECHA	FERRITINA	ST	HEMOGLOBINA

VALORES DE LABORATORIO NORMALES

Adultos	Ferritina	ST	Hemoglobina
Mujer:	20 ng/ml-200 ng/ml	20 %-50 %	12.0 g/dl-15.5 g/dl
Hombre:	40 ng/ml-300 ng/ml	20 %-50 %	13.5 g/dl-17.5 g/dl



AYUDE A SU SER QUERIDO A PROGRAMAR LAS CITAS
Considere usar un calendario compartido para poder hacer un seguimiento de sus visitas.



COMUNIQUE LOS BENEFICIOS DE SUS TRATAMIENTOS
Tener insuficiencia cardíaca puede ser frustrante, pero los beneficios de comenzar (y cumplir con) su régimen de tratamiento pueden ayudar a su ser querido a ver mejoras.



RECOPILE LAS NOTAS
Durante las citas, a muchos pacientes les cuesta recordar todo lo que quieren decir. Puede ayudarlo teniendo las notas a mano.



ORGANÍCESE
Manejar los medicamentos diarios puede ser un desafío. Considere organizar los medicamentos con un pastillero que tenga los días de la semana. Guarde los medicamentos en lugares accesibles y programe recordatorios en el teléfono de su ser querido para que los tome.



CONOZCA AL EQUIPO DE ATENCIÓN DE SU SER QUERIDO SI ES POSIBLE.
Explore todos los recursos necesarios para apoyar a su ser querido.



ESCUCHE SUS INQUIETUDES
El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca puede afectar negativamente a la salud mental de su ser querido. Es frecuente que los pacientes hagan preguntas sobre su futuro, y usted puede ayudar a asegurarle que cuenta con el apoyo adecuado.



CUÍDESE
Para apoyar a un ser querido, también tiene que apoyarse a sí mismo. Si puede, asegúrese de dedicarse tiempo a usted para evitar agotarse.



UN DÍA A LA VEZ
Es fácil abrumarse en este recorrido como cuidador. El apoyo y las herramientas adecuados pueden ser útiles.

Haga [clic aquí](#) para ver la información de prescripción completa y consulte la información importante de seguridad en las páginas [22-23](#).



Injectafer® (inyección de carboximaltosa férrica) está disponible solo con receta. Consulte a su proveedor de atención médica si Injectafer es correcto para usted.

¿Qué es Injectafer?

Injectafer es un medicamento de venta con receta de reemplazo de hierro, administrado solo por su proveedor de atención médica o bajo su supervisión. Injectafer se inyecta en la vena para tratar la anemia por deficiencia de hierro en adultos y niños a partir de 1 año de edad. Debe utilizar Injectafer solo si no ha respondido bien al tratamiento con hierro oral o si es intolerante al tratamiento de hierro oral. También se usa para tratar la anemia por deficiencia de hierro en adultos con enfermedad renal crónica que no reciben diálisis. Injectafer se usa para mejorar la habilidad de hacer ejercicio (capacidad de ejercicio) en pacientes adultos con deficiencia de hierro e insuficiencia cardíaca de leve a moderada. Se desconoce si Injectafer es seguro y eficaz en niños con anemia por deficiencia de hierro que tienen menos de 1 año de edad o en niños con deficiencia de hierro e insuficiencia cardíaca de leve a moderada para mejorar la capacidad de ejercicio.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Quién no debe recibir Injectafer?

No debe recibir Injectafer si es alérgico a la carboximaltosa férrica o a cualquiera de los otros ingredientes en Injectafer. El ingrediente activo en Injectafer es carboximaltosa férrica; los ingredientes inactivos son agua para inyección, hidróxido de sodio o ácido clorhídrico.

¿Qué debo informarle a mi proveedor de atención médica antes de recibir Injectafer?

Antes de recibir Injectafer, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:

- Tuvo una reacción alérgica al hierro administrado en la vena.
- Tiene antecedentes de problemas para que su cuerpo absorba ciertas vitaminas o fosfato.
- Tiene enfermedad intestinal inflamatoria.
- Tiene hiperparatiroidismo.
- Tiene niveles bajos de vitamina D.
- Tiene presión arterial alta.
- Ha recibido Injectafer previamente.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Injectafer puede dañar a su bebé en gestación. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si queda embarazada o cree que está embarazada durante el tratamiento con Injectafer.
- Está amamantando o planea amamantar. Injectafer pasa a la leche materna. No se sabe si Injectafer dañará a su bebé. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento con Injectafer.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

¿Cómo recibiré el Injectafer?

Su proveedor de atención médica le administra Injectafer en la vena (por vía intravenosa) en 2 dosis con al menos 7 días de diferencia. Para algunos pacientes con insuficiencia cardíaca, es posible que sea necesario administrar 2 dosis con 6 semanas de diferencia. Si su proveedor de atención médica decide que es adecuado para usted, puede administrarle Injectafer por vía intravenosa en un tratamiento de una sola dosis. El tratamiento con Injectafer puede repetirse si su proveedor de atención médica decide que es necesario.

Haga [clic aquí](#) para ver la información de prescripción completa de Injectafer.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Injectafer?

Injectafer puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Reacciones alérgicas.** Han ocurrido reacciones alérgicas graves potencialmente mortales, que pueden provocar la muerte, en personas que reciben Injectafer y que pueden incluir los siguientes signos y síntomas: presión arterial baja, sensación de mareo o aturdimiento, pérdida de la conciencia, problemas para respirar, hinchazón, latidos cardíacos rápidos, piel fría o húmeda, pies o manos que se tornan azul, picazón, erupción cutánea, ronchas y/o sibilancias. Su proveedor de atención médica lo observará mientras recibe Injectafer y durante al menos 30 minutos después. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta algún signo o síntoma de reacciones alérgicas durante el tratamiento con Injectafer o después.
- **Síntomas de niveles bajos de fosfato en sangre.** Injectafer puede causar niveles bajos de fosfato en sangre que pueden ser graves y provocar ablandamiento de los huesos o fracturas óseas, especialmente en personas que han recibido varios tratamientos con Injectafer. Su proveedor de atención médica puede controlar sus niveles de fosfato en sangre antes de repetir el tratamiento con Injectafer si usted corre el riesgo de tener niveles bajos de fosfato en sangre. Si es necesario repetir el tratamiento dentro de los 3 meses del último tratamiento, su proveedor de atención médica debe controlar sus niveles de fosfato en sangre. Informe a su proveedor de atención médica si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas de niveles bajos de fosfato en sangre durante el tratamiento con Injectafer: sensación de mucho cansancio, debilidad o dolor muscular, dolor de huesos o articulaciones, fracturas óseas.
- **Presión arterial alta.** Ha ocurrido presión arterial alta, a veces con enrojecimiento y calor en la cara (rubor facial), mareos o náuseas, durante el tratamiento con Injectafer. Su proveedor de atención médica controlará su presión arterial y lo controlará para detectar signos y síntomas de presión arterial alta después de que reciba Injectafer

Los efectos secundarios más frecuentes de Injectafer incluyen:

- En adultos: náuseas, presión arterial alta, rubor, reacciones en el lugar de la inyección, enrojecimiento de la piel, niveles bajos de fosfato en sangre y mareos.
- En niños: niveles bajos de fosfato en sangre, reacciones en el lugar de la inyección, erupción cutánea, dolor de cabeza y vómitos.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Injectafer.

Comuníquese con su proveedor de atención médica para recibir asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de Injectafer


A veces, los medicamentos se recetan para otros propósitos que los que se describen en el folleto informativo para el paciente. Puede pedir a su farmacéutico o proveedor de atención médica información sobre Injectafer que esté escrita para profesionales de la salud.

Para informar efectos secundarios, comuníquese con American Regent al 1-800-734-9236, por correo electrónico a pv@americanregent.com o por fax al: 1-610-650-0170.

También puede informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088 o en www.fda.gov/medwatch.

La información sobre los riesgos que se proporciona aquí no es completa. Para obtener más información sobre Injectafer, hable con su proveedor de atención médica o farmacéutico. Se puede encontrar el etiquetado del producto aprobado por la FDA en www.injectafer.com/pdf/pi.pdf o llamando al 1-800-645-1706.





Para la **DEFICIENCIA DE HIERRO** en
la **INSUFICIENCIA CARDÍACA**,

RECUERDE LAS 3 "T"

TAKE NOTICE (PRESTE ATENCIÓN) a cuáles son sus signos y síntomas (algunas deficiencias de hierro y síntomas de insuficiencia cardíaca pueden tener el mismo aspecto).

TALK (HABLE) con su profesional de atención médica sobre sus síntomas.

TEST (HÁGASE PRUEBAS) y cumpla con las revisiones médicas regulares. Pregúntele a su profesional de atención médica si le está midiendo los niveles de ferritina, ST y hemoglobina.

HAGA CLIC AQUÍ PARA VISITAR
[INJECTAFER.COM/IDINHE](https://injectafer.com/idinhe)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

¿Quién no debe recibir Injectafer?

No debe recibir Injectafer si es alérgico a la carboximaltosa férrica o a cualquiera de los otros ingredientes en Injectafer. El ingrediente activo en Injectafer es carboximaltosa férrica; los ingredientes inactivos son agua para inyección, hidróxido de sodio o ácido clorhídrico.

Haga [clic aquí](#) para ver la información de prescripción completa y consulte la información importante de seguridad en las páginas **22-23**.



Daiichi-Sankyo

Para comunicarse con nosotros por preguntas o inquietudes sobre un producto de Daiichi Sankyo, llámenos al: 1-877-4DS-PROD (1-877-437-7763).

American Regent, Inc. es miembro del grupo Daiichi Sankyo. Injectafer® y el logotipo de Injectafer® son marcas comerciales de Vifor (International), Inc., Suiza. Injectafer® se fabrica con autorización de Vifor (International), Inc., Suiza. Las marcas comerciales que no pertenecen a American Regent, Inc. o a Vifor (International) son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2025 Daiichi Sankyo, Inc. PP-US-IN-4739 07/25

